


ذیابیطس اور گردہ



ذیابیطس کا گردوں پر اثر، علامات، بچاؤ اور علاج کے بارے میں مکمل رہنمائی

ذیابیطس

ذیابیطس کا مرض باقی دنیا کی طرح ہمارے ملک میں بھی بہت عام ہے۔ مختلف تخمینوں کے مطابق %10-12 لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ذیابیطس دو طرح کی ہوتی ہے۔

قسم دوم 95% مریض

بڑی عمر کے لوگوں میں

انسولین بنتی تو ہے مگر صحیح طرح سے اثر نہیں کر پاتی۔ عام طور پر زیادہ وزن والے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ ورزش، خوراک کا پرہیز اور گولیوں سے علاج ممکن ہے۔

قسم اول

بچوں اور کم عمر افراد میں

ان مریضوں میں انسولین ہارمون جو کہ خون میں شوگر کی مقدار کا توازن قائم رکھتی ہے، کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔

ذیابیطس کا گردوں پر اثر

شوگر کی وجہ سے خون کی نالیوں پر اثر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور سخت ہو جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے گردوں کو خون کی پوری مقدار نہیں پہنچتی اور گردے خون کی مناسب طریقے سے صفائی نہیں کر سکتے۔

گردے جسم سے پانی، نمکیات اور دوسرے فاضل مضر صحت مادے مثلاً پوریا وغیرہ خارج نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ان کی مقدار جسم میں بڑھ جاتی ہے۔ جسم میں نمکیات اور پانی کی مقدار زیادہ ہو جانے کی وجہ سے جسم خاص کر ٹانگوں پر سوجن ہو جاتی ہے اور اگر یہی پانی پھیپھڑوں میں جمع ہو جائے تو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔


فاضل مضر صحت مادے جسم کے تقریباً ہر حصے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ذیابیطس کا مرض جسم کے اعصابی نظام پر بھی اثر کرتا ہے جس کی وجہ سے مثلاً کمزور ہو جاتا ہے۔ اور پیشاب کی پوری مقدار مثلاً سے خارج نہیں ہو پاتی اور مثلاً میں پیشاب کے ہر وقت جمع رہنے سے گردوں میں پریشر بڑھ جاتا ہے جو کہ گردوں کے لیے مزید نقصان کا باعث بنتا ہے۔

KIDNEY CARE CENTER

www.kidneycare.pk

042-35940252

0339-8484357



اسکے علاوہ پیشاب جب مٹانے میں ہر وقت جمع رہے گا تو جراثیم بھی مٹانے سے خارج نہیں ہو پاتے اور پیشاب میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے تیزی سے نشوونما پاتے ہیں۔ اور گردوں کی انقباض کا باعث بنتے ہیں جس سے گردوں کو مزید نقصان پہنچتا ہے۔


س۔ ذیابیطس کے کتنے فیصد لوگوں کو گردے کی بیماری ہوتی ہے؟

ج۔ 30-40 فیصد لوگ قسم اول اور 10-30 فیصد قسم دوم کے مریض گردے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں

س۔ ذیابیطس کے مریضوں میں گردے کی بیماری کی کیا علامات ہیں؟

گردے کی بیماری کی علامات

ذیابیطس کے مریضوں میں گردے کی بیماری کی وجہ سے سب سے پہلے پیشاب میں البیومن ظاہر ہوتی ہے۔ البیومن آنے سے پیشاب میں جھاگ زیادہ بنتی ہے۔ پیشاب میں البیومن لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائی جاسکتی ہے اس کے علاوہ گھر پر بھی بڑی آسانی سے چیک کیا جاسکتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو ہر سال باقاعدگی سے پیشاب میں البیومن کا معائنہ کروانا چاہیے۔ جسم میں پانی جمع ہو جانے سے، سوجن، وزن کا بڑھنا، بلڈ پریشر کا ہو جانا اور رات کے وقت پیشاب بار بار آنا شامل ہے۔



اس کے علاوہ دوسری علامات بھی ہو سکتی ہیں:

بھوک کا نہ لگنا	کمزوری اور تھکاوٹ	متلی اور تے
الچھن	جسم میں درد خاص کر نائگوں میں	خارش
چہرے کی رنگت کا پیلا پن	بے چینی	الچھن

کیونکہ انسولین گردوں کے راستے جسم سے خارج ہوتی ہے۔ تو گردوں کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اسکی مقدار جسم میں بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے شوگر کی مقدار خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اور انسولین یا گولیوں کی مقدار کم یا بالکل بند کرنی پڑتی ہے۔

فوری توجہ دیں

اگر آپ شوگر کے مریض ہیں اور ان میں سے کوئی بھی علامت آپ میں پائی جاتی ہیں۔ تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ایسی صورت میں خون میں یوریا، Creatinine اور پیشاب کا ٹیسٹ تشخیص میں مدد دے سکتا ہے۔


س۔ اگر ذیابیطس کی وجہ سے گردے خراب ہو جائیں تو کیا کیا جاسکتا ہے؟

اگر اوپر دی گئی علامات میں سے کوئی علامت ظاہر ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جو کہ خون اور پیشاب کے مختلف ٹیسٹوں کی مدد سے آپکے گردوں کی حالت کا اندازہ کر کے مناسب دوائی اور خوراک تجویز کرے گا۔ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ آپکے گردے شوگر کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں اور کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا مختلف علاج ہو سکتا ہے۔

علاج اور بچاؤ کے اقدامات

1۔ شوگر کا کنٹرول

ذیابیطس کا گردوں پر اثرات کم کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ شوگر کو شروع ہی سے کنٹرول کیا جائے کیونکہ اگر ایک مرتبہ شوگر کا اثر گردے پر ہو جائے تو اس کو آگے بڑھنے سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔



2۔ بلڈ پریشر کا کنٹرول خاص کر ایک خاص دوائی یعنی ACE Inhibitors کا استعمال کرنا چاہئے۔

KIDNEY CARE CENTER

www.kidneycare.pk

042-35940252

0339-8484357



گردے کے مریضوں کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ بلڈ پریشر گردے کو مزید نقصان پہنچاتا ہے اس لئے شوگر کے مریضوں کو بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنے کے لئے پوری کوشش کرنی چاہئے۔ ذیابیطس کے مریضوں کا بلڈ پریشر 80/130 اور 70/120 کے درمیان ہونا چاہئے۔

3۔ انفیکشن کا علاج

شوگر کے مریضوں کو گردے کی انفیکشن ہو جانے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اور یہ انفیکشن گردوں کو مزید نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ اس لئے گردوں کے انفیکشن کی بروقت تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے۔

4۔ مثانے کی کزوری کی وجہ سے اگر پیشاب مثانے سے صحیح طریقے سے خارج نہ ہو سکے تو اس کا علاج بہت ضروری ہے۔

5۔ گردوں کو نقصان پہنچانے والی ادویات سے پرہیز مثلاً درد دور کرنے والی ادویات



6۔ خوراک میں لحمیات (Protein) کی مقدار کم کرنا پیشاب میں ذیابیطس کے مریضوں کو جو البیومن (Protein) آتی ہے وہ بھی گردے کو مزید نقصان پہنچاتی ہے اس لئے پیشاب میں البیومن کم کرنے کے لئے خوراک میں پروٹین اور نمک کی مقدار کم کرنے کے علاوہ خاص دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔



7۔ سگریٹ کا استعمال بند کرنا شوگر کے مریض بلڈ پریشر کی موجودگی میں اگر سگریٹ کا استعمال کر رہے ہوں تو وہ بھی بیماری کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے اس لئے ان مریضوں کو سگریٹ سے مکمل پرہیز کرنا چاہئے۔

8۔ اگر کو لیسٹروں کی مقدار خون میں زیادہ ہو تو اس کا علاج اگر شوگر کے مریض کا کو لیسٹروں زیادہ ہو تو اس کو بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔

س۔ اگر ان تمام باتوں کے باوجود گردے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہو سکتا ہے؟

ج۔ ایسی صورت میں مریض کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف طرح کے علاج موجود ہیں۔ جس میں ڈائلیسس اور ٹرانسپلانٹ یعنی گردے کی پیوند کاری شامل ہیں۔ ڈائلیسس سے مراد خون کی صفائی ہے۔ جو کہ دو طرح سے کی جاتی ہے۔

1۔ پیٹ والی ڈائلیسس: پیٹ میں ایک چھوٹی سی نالی ڈال کر ایک خاص محلول پیٹ میں بار بار ڈالا اور نکالا جاتا ہے۔ اور پیٹ کی جھلی سے فلٹر کا کام لیا جاتا ہے۔



2۔ مشین کے ذریعے ڈائلیسس: اس میں جسم کا خون مشین میں لگے فلٹر سے گزار کر صاف کیا جاتا ہے اور یہ عمل ہفتے میں دو سے تین بار تمام عمر کے لیے کیا جاتا ہے۔

3۔ گردے کی پیوند کاری: اگر کسی عزیز یا رشتے دار کا خون کا گروپ اور گردہ میچ ہو تا ہو تو وہ اپنا ایک گردہ مریض کو دے دے تو اس سے اس کی اپنی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جبکہ مریض کی نہ صرف زندگی بچ جائے گی بلکہ وہ ڈائلیسس سے بھی آزاد ہو جائے گا۔